



2
Rememoire, communiqué à l'Académie par
M^r. Ritsch Premier Chirurgien du Roy de Pologne
a pour objet la cure des douleurs considerables
dans la moitié de la tête et des violentes convulsions
avec des Paroxismes plus ou moins longs dans
les muscles du Visage. son ouvrage m'a paru très
intéressant, et meriter d'autant plus l'attention
de l'Académie, que cette espee d'affection nerveuse
n'est pas fort connue, et peut être par si rare qu'on
le pense. Cette maladie, qui peut conduire à la mort
comme on l'a vu, ^{à qui} et au moins occasionne des
tourmens qui subsistent toute la vie, a son principe
dans le tronc de quel que nerf, sans qu'il y ait de
changement à l'extérieur, et sans qu'on en sache
la cause. Mais si on coupe ce tronc, les douleurs, et
les convulsions cessent peu de tems après. Il paroît
que la difficulté consiste à trouver le nerf ou le
principe du mal existe.

Des quatre observations que rapport M^r. Ritsch,

Deux dames qui font les sujets des deux premières, ont été guéries par l'incision. A l'une, on a coupé le nerf maxillaire qui sort par le trou sous orbitaire d'où la douleur s'étendait dans la moitié du visage et du crane. Cette Dame n'a souffert cette opération qu'après avoir éprouvé, sans succès, tous les remèdes possibles. On lui avoit arraché toutes les dents molaires du côté malade, elle avoit fait usage des plus forts antiscorbutiques, antiscorbutiques et même des mercuriaux.

L'autre Dame qui souffroit, comme la précédente, prit aussi les mêmes remèdes. On finit par, on tenta deux fois de détruire par le cautère actuel la portion dure du nerf auditif à l'endroit où il forme conjointement avec le nerf maxillaire inférieur la pâte d'ore sans que la malade s'en soit trouvée nullement soulagée. M^r Ritsek jugea, après un examen, que la douleur avoit son origine dans le nerf maxillaire inférieur à sa sortie du trou mentionné d'où elle s'étendait à la joue, et à la tête. Quoique cette portion de nerf eût dû être brûlée, il proposa l'incision de ce nerf. On la fit, et l'opération

fur suivie de tout le mieux possible. La 1.^{re} de ces
dames a été guérie de la Plaque en 7. et la seconde
en 5 jours.

Un Particulier de Province attaqué de la même
maladie, et dont les Symptômes sont à peu près
les mêmes que ceux qu'éprouvoient les deux
dames précédentes fait le sujet de la 3.^e observation
aussi a-t-il fait à peu près les mêmes remèdes.
Il s'est fait arracher les dents du côté malade,
brûler le nerf maxillaire supérieur avec la
pierre infernale, l'eau forte; et couper avec le
bistouri même sans en tirer aucun soulagement.

Enfin la 4.^e observation a été communiquée
à M.^r Rittik par M. Louis. M.^r Le Vasseur —
membre du collège de chirurgie en fait le sujet.
Des qu'il fut attaqué de ce mal, il fin avec la
plus grande persévérance du monde beaucoup —
de remèdes, à ^{peu} près de l'espèce de ceux dont
les 3 malades précédents avoient fait usage. M.^r
Louis, qui connu le mal, appliqua deux fois en
six mois de distance un bouillon de feu pour cauteriser



Dans la bouche sur l'os maxillaire inférieur le point
ou le malade disoit sentir la douleur la plus
aiguë: Mais cela ne eut aucun succès. M.^r
le Masseur mourut de ses douleurs, ou avec ses
douleurs sans avoir tiré du soulagement d'aucun
remède.

De tous ces faits, on peut conclure qu'une
affection nerveuse de cette espèce qui est locale
est au dessus des ressources de la médecine interne;
que l'incision semble être préférable au cautère
actuel, en ce que l'instrument tranchant coupe
sûrement et nettement le nerf ou le désordre
se trouve, et qu'il paroit que le point essentiel
est d'avoir des signes d'où passent les douleurs.

M.^r Bittok en donne de vidents, mais non pas
suffisants, avec queis croire. Il remarqua à la Dame
qui fait le sujet de la première observation que
la douleur commençoit à l'endroit de la joue ou le
nerf maxillaire supérieur sort du trou sous orbitaire,
et que de là elle se faisoit sentir successivement
dans toute la moitié du Visage, et du crâne; et qu'à
la Dame qui fait le sujet de la seconde observation

c'est au contraire, la douleur ayant son origine
dans le nerf maxillaire inférieur à la sortie du
tron mentonnier d'où elle s'étendait à la moitié
de la tête jus qu'au Vertex. Ses signes remarquables
ne tromperent point M. Riffet, puisque l'opération
fut à l'une et à l'autre suivie du plus grand
succès. Mais pourquoi le cautère actuel qu'on
appliqua à la tige sur la portion dure du
nerf auditif et l'endroit où il forme, conjointement
avec le nerf maxillaire inférieur, la piate
d'oreille, ne produisit il pas le même effet, ainsi
que le cautère que M. Louin appliqua sur
le lieu où M. le Vasseur sentait ses douleurs?
Est-ce que le cautère n'aurait pas pénétré jusqu'au
nerf d'où partait la douleur? ou y aurait-il dans
ce cas quelque différence entre détruire le nerf
dans le lieu même où la cause du spasme
existe, ou de le détruire dans un lieu plus
éloigné? Comparons la douleur qui provient
d'une dent gâtée à celle dont il est question.
On sçait que la carie d'une dent a souvent



occasionné des douleurs de tête quelque fois
continuelles, et semblables à celles dont M.
Riffel parle dans son mémoire, et qui cessent
des qu'on a arraché l'adent malade, parce que
l'on divise le petit nerf ^{à affecté} par l'arrachement. On
sean aussi qu'il y a des personnes qui en
souffrent beaucoup sans qu'elles puissent
designer bien clairement l'adent qui est causé
et sans que le dentiste puisse l'adistinguer.
Le dentiste, pour s'en assurer a recours à un
petit moyen. Il apuie le doigt fortement sur les
dents les unes après les autres, ou bien il y
donne de petits ^{coups} avec un instrument d'acier,
celle ou ecoups, ou cette pression cause au
malade une plus vive douleur est l'adent qu'il
arrache, et cette expérience réussit pour l'ordinaire.
~~Or~~ Si la pression faite séparément sur le nerf
manillaire inférieur, ou sur le supérieur, ou sur
la portion dure, ou sur quelques Ramaux de
ces nerfs, excite au malade une très vive douleur
qui vient d'un de ces nerfs sans venir des autres, c'est-à-dire
peut être un moyen de découvrir le lieu où est le nerf

malade, et celui qu'il faudroit inciser. Je ne sçais
si iene me trompe, mais en tout cas, il est permis
avec que j'en pense d'attendre quelque chose d'au-
tre certain cas. C'est à l'expérience à démentir
ou à confirmer ce que i'edis. Et en juges encore
par un fait analogue au sujet dont il est
question, iene suis pas fort éloigné de la vérité.

Il survint en 1735. à un enfant de 12 an-
née vive douleur au talon, lorsqu'en marchant
il appuyoit dessus, ce qui le faisoit boiter. Le Père
qui étoit un avocat célèbre, crut que c'étoit un
prétexe que son fils prenoit pour ne point aller
en classe. Cependant il appella son chirurgien
ordinaire qui le saigna, le purgea, lui appliqua
des cataplasmes anodins et des emplâtres de toutes
espèces. Trois semaines se passerent sans nulle
diminution de douleur, à faire ces remèdes.

Appelé alors par le Père, i'en eus soin avec le chirurgien,
et i'en fis pendant quelque temps des douches, et des
bains, appliqués des emplâtres et des cataplasmes,



ces remèdes ne produisirent pas un meilleur effet.
Quoique l'enfant qui avoit beaucoup d'esprit et
de raison, fit bien connaître son mal, ie le fis
marcher devant moi, il paroissoit souffrir beaucoup
en voulant se soutenir sur le pied malade, et se
seroit trouvé mal, s'il eut continué à marcher, en
s'appuyant sur le talon. Jus qu'alors ie crus que
le mal dependoit de la totalité du pied, néanmoins
en l'examinant avec plus d'attention, ie trouvais
la jambe, le pied et le talon dans leur état naturel;
mais en appuyant le bout du doigt dans différents
endroits du talon, ie remarquai qu'il n'y avoit que
le centre de cette partie, de l'étendue d'environ deux
ou trois lignes, où l'enfant ressentoit une vive
douleur, ailleurs ie n'en sentoie pas la moindre.
Sans savoir la juste cause de cette douleur que
ie pensois néanmoins provenir d'un changement
dans la structure de la partie, ie proposai de faire
au talon une incision qui traversa le ^{lieu} centre de la
douleur, et de faire saigner un peu la plaie. Cette
proposition alarma le Pere qui appella M. Boudou
en consultation. Ce celebre chirurgien prétendoit
que c'étoit une collection de matière qui vouloit se

former sous le planton, et conseille des maturatifs
les plus forts qu'on appliqua sans produire nulle
effet. Rappelle de nouveau, il se rendit, avec même
à la vérité, à mon avis. Je fis au milieu du Talon
une incision de la longueur de quatre travers de doigts,
qui traversoit le point douloureux, et qui pénétra
jusqu'au calcaneum. Je pansai la plaie avec de
la charpie sèche que ie ne relevai que 3 ou 4 jours
après. Je me servis dans les pansements suivants, d'un
digestif simple dans lequel ie trempai un petit
Boudonnet que ie mis fort mollement dans le fond
de la plaie pour exciter un peu de Suppuration
qui me paroissoit nécessaire dans ce cas. —

Lorsqu'elle fut établie ie touchai avec le bout du doigt
les bords de la Plaie, et le fond avec de la charpie
sèche, en appuyant un peu. L'enfant ne ressentit
plus d'adoulours qu'il avoit éprouvé lorsqu'il
appuyoit son talon à terre. Je fus alors certain
que l'opération auroit tous les succès que ie
m'en étois promis. En effet la guérison de la
Plaie s'accomplit dans moins d'un mois. L'épreuve
soit en appuyant le doigt sur la cicatrice, soit en
faisant appuyer le talon sur le planché, confirma



mon opinion. L'enfant a retourné au collège,
sans souffrir, et iouir encore, a ce que l'on croit,
en Espagne ou il est passé, de la faculté de
marcher sans ~~souffrir~~ douleur.

M. Petit, dans les connoissances supérieures
en chirurgie, ne permetteur pas de bouter de tout
ce qu'il a vu dans cette académie, nous a rapporté
plusieurs faits qui ont rapport à l'objet dont il est
question. Une personne qui avoit à la partie
supérieure du Bras une espèce de bouton gros
comme le bout ~~de~~ doigt, qu'on ne pouvoit toucher
ou froter avec l'habit ou autre chose sans lui
causer des douleurs extrêmes et sans le faire trouver
mal, vint consulter M. Petit. ^{Un} ~~Un~~ ^{excellent} chirurgien,
après s'être assuré du fait, cerna le bouton, et
l'emporta. La plaie guérit, et le malade ne
ressentir plus de douleur.

Il nous a encore entretenu d'une maladie
semblable à celle de M. le Vasseur, et qu'il avoit
un chirurgien du collège de chirurgie nommé
le Grand. Il sentoit à la joue une douleur
très vive qui partoit du Menton, sur cette et qui s'étendoit

partie en suivre les différentes
ramifications du nerf qui forme ce
qu'on appelle la pâte d'oye. M^r Petit
a donc proposé à ce chirurgien avant
proposé de faire une incision au nerf
d'où partoit la douleur. (elle a été faite avec quelque
succès)

M^r Petit ne rapporte la guérison que
de deux Dames dont il est à présent fort
éloigné. Quelque confiance que l'Académie
ait à ce habile chirurgien, je pense
que, vu le peu d'exemples d'opérations
faites, ins qu'à présent, dans des cas
semblables à ceux dont il s'agit, il seroit
à souhaiter qu'avant de faire usage
de son mémoire, on puisse le voir
si les personnes qu'il a vu guérir
par son opération, ou qu'on lui a
guéries, ont conservé l'état où il a laissé
l'une, et où on lui a mandé que l'autre
étoit. le 14 mai 1766. Delafaye



cu. de la pâte
a rapporté un fait
de rémittence.

don
u. André cher. de
aiguille a inséré le nerf
maxillaire avec succès.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

